

ARANHAS THERIDIIDAE DA ILHA DE MARACÁ, RORAIMA, BRASIL.
IV. GÊNERO *THYMOITES* (ARANEAE)¹

Maria Aparecida L. Marques²
Erica Helena Buckup²

ABSTRACT

THERIDIIDAE SPIDERS FROM MARACÁ ISLAND, RORAIMA, BRAZIL. IV. GENUS *THYMOITES* (ARANEAE). Up to now, only two species of *Thymoites* Keyserling have been found in Maracá Island, Uraricoera River, Roraima, Brazil: *T. maracayensis* Levi, new record, and *T. cravilus*, sp.n..

KEYWORDS. Neotropical, Araneae, Theridiidae, *Thymoites*, new species.

INTRODUÇÃO

O gênero *Thymoites* Keyserling, 1884 está representado por 56 espécies na Região Neotropical (LEVI, 1959; 1964; 1967). Para o Brasil, foram registradas 12 espécies, das quais uma para o estado do Pará e 11 ocorrentes nas regiões Sul e Sudeste do país. Foram coligidas duas espécies desse gênero na Ilha de Maracá, Roraima: *T. cravilus*, sp. n. e *T. maracayensis* Levi, 1964, descrita com base em única fêmea procedente da Venezuela. Este é o segundo registro desta espécie e o primeiro para o Brasil.

Abreviaturas usadas no texto segundo BUCKUP & MARQUES (1989). As aranhas foram depositadas nas coleções do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus e Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN), Porto Alegre.

Thymoites cravilus, sp.n.

(Figs. 1-6)

Tipos. Holótipo ♂, Ilha de Maracá (3° 15' - 3° 35'N e 61° 22' - 61° 58'W), Rio Uraricoera, Roraima, Brasil, 07.XII.1987, A.A. Lise col. (MCN 21563); parátipos: 2 ♀, 24.III.1987, A.A. Lise col. (INPA), 2 ♀, 07.XII.1987, E.H. Buckup col. (MCN 21569).

1. Parte do Projeto Maracá, 1987-1988 (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, "Royal Geographic Society", Secretaria Especial do Meio Ambiente).

2. Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Caixa Postal 1188; CEP 90.001, Porto Alegre, RS, Brasil.

todos da mesma localidade do holótipo.

Etimologia. O nome específico é uma combinação arbitrária de letras.

Diagnose. Machos de *Thymoites cravilus*, sp.n., têm a região dos olhos protuberante com um sulco transversal entre os olhos médios anteriores e posteriores (figs. 1,2), como em *T. caracasanus* (Simon, 1894), *T. notabilis* (Levi, 1959) e *T. lori* Levi, 1964, distinguindo-se pela forma dos escleritos do palpo (figs. 3,4); fêmeas são próximas de *T. ebus* Levi, 1964 e de *T. urubamba* Levi, 1967, distinguindo-se pelo percurso horizontal dos ductos na porção próxima aos poros de abertura (figs. 5,6) enquanto que nas duas primeiras espécies os ductos formam um V.

Macho. Carapaça, esterno, quelíceras, enditos amarelo-alaranjados. Pernas da mesma cor, exceto perna III e fêmures amarelo-claros. Abdômen esbranquiçado, sem **scutum**. Carapaça alta na região cefálica, protuberante na área dos olhos médios, com um sulco entre os OMA e OMP; clipeo com uma saliência transversal. Uma série de cerdas longas abaixo dos OMA. Olhos, subiguais, marginados de negro. OMA levemente menores do que os outros. OMA separados por pouco mais do que seu diâmetro e pelo seu raio dos OLA. OMP afastados por pouco mais do que seu diâmetro e dos OLP por pouco mais do que seu raio.

Medidas (mm). Comprimento total 1,12. Carapaça: comprimento 0,61, largura 0,47. Abdômen: comprimento 0,57, largura 0,47, altura 0,62. Pernas 1423. Comprimento I/II/III/IV: fêmures 0,56/0,46/0,36/0,50; patelas 0,18/0,16/0,15/0,16; tífias 0,36/0,27/0,21/0,32; metatarsos 0,33/0,26/0,18/0,26; tarsos 0,26/0,23/0,21/0,23. Totais 1,69/1,38/1,11/1,47.

Fêmea. Colorido semelhante ao do macho. Carapaça não modificada. Olhos subiguais, OMA separados entre si por quase um diâmetro e dos OLA por cerca de um quinto do seu diâmetro. OMP afastados por quase um diâmetro e dos OLP pelo seu raio.

Medidas (mm). Comprimento total 1,17. Carapaça: comprimento 0,50, largura 0,41. Abdômen: comprimento 0,73, largura 0,68, altura 0,81. Pernas 1423. Comprimento I/II/III/IV: fêmures 0,52/0,41/0,26/0,46; patelas 0,17/0,17/0,13/0,16; tífias 0,32/0,23/0,18/0,30; metatarsos 0,31/0,23/0,18/0,25; tarsos 0,26/0,23/0,20/0,22. Totais 1,58/1,27/0,95/1,39.

Thymoites maracayensis Levi, 1964


Thymoites maracayensis LEVI, 1964:456, figs. 3,4.

Material examinado. BRASIL. **Roraima:** Ilha de Maracá, Rio Uraricoera, 1 ♀, INPA, 21-30. XI.1987, J.A. Rafael col. ("fogging"/copas de árvores); **Amazonas:** Manaus, ♀, MCN 21562, 14.III.1987, A.A. Lise col.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUCKUP, E.H. & MARQUES, M.A.L. 1989. Aranhas Theridiidae da Ilha de Maracá, Roraima, Brasil. I. Nova espécie de *Echinotheridion* e descrição da fêmea de *Phoroncidia moyobamba*

- (Araneae). **Iheringia**, Sér. Zool., Porto Alegre, (69): 123-129.
- LEVI, H.W. 1959. The spider genera *Achaearanea*, *Theridion* and *Sphyrotinus* from Mexico, Central America and West Indies (Araneae, Theridiidae). **Bull. Mus. comp. Zool. Harv.**, Cambridge, Mass., **121** (3): 57-163.
- . 1964. The spider genus *Thymoites*. in America (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. comp. Zool. Harv.**, Cambridge, Mass., **130** (7): 447-471.
- . 1967. Habitat observations, records, and new South American Theridiid spiders (Araneae: Theridiidae). **Bull. Mus. comp. Zool.**, Cambridge, Mass. **136** (2): 21-37.



Figs. 1-6. *Thymoites cravilus*, sp.n. Macho, carapaça: 1. lateral; 2. dorsal; palpo esquerdo: 3. ventral, 4. prolateral. Fêmea, epígino: 5. ventral, 6. dorsal. Escalas: 0,1 mm.